

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan APO-go® Pen ha biverkningar. Meddela din läkare om du tror att läkemedlet får dig att må dåligt eller om du upplever något av följande:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 10%)

- knutor under huden vid injiceringsstället som gör ont eller är besvärliga och som kliar. Om detta problem uppstår kan din läkare råda dig att det ibland kan hjälpa att inte injicera på exakt samma ställe varje gång utan byta ställe ibland.

Vanliga (förekommer hos 1–10%)

- illamående eller kräkningar.*
- förvirring eller hallucinationer.

Ovanliga (förekommer hos 0,1–1%)

- lågt blodtryck (svag eller yr då du reser dig).
- ökade ofrivilliga rörelser (s k dyskinesier, överrörlighet) eller förvärrade skakningar under s k "on"-perioder (dvs då läkemedlet har effekt).

Sällsynta (förekommer hos 0,01–0,1%)

- blodbrist eller blodrelaterade rubbningar (blodsjukdomar).
- Somnolens (överdriven dåsigheit)

* De flesta patienter tar domperidon för att förhindra illamående och kräkningar. Meddela din läkare så fort som möjligt om du tar domperidon och ändå mår illa, eller om du inte tar domperidon och mår illa.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

Apo-go® Pen kan orsaka somnolens (överdriven dåsigheit). Därför skall du avstå från att köra eller ägna dig åt aktiviteter där nedsatt vakenhet kan utsätta dig och andra för risken för allvarliga skador eller dödsfall (t ex använda maskiner) såvida du inte har kommit över dylika upplevelser av somnolens.

Vid behandling med Apo-go® bör du vara särskilt försiktig när du kör eller använder maskiner. Om du känner dig överdrivet dåsig bör du avstå från att köra eller använda maskiner och du bör kontakta din läkare.

5. FÖRVARING AV APO-go® Pen

- APO-go® Pen är framtagen för att man lätt ska kunna använda den när man behöver det. Injektionspennan kan medföras i jackfickan, handväskan eller på annat bekvämt ställe.
- Förvara dina injektionspennor vid högst 25°C. Förvara alltid injektionspennor som du inte använder i deras originalförpackning.
- Använd ej produkten om lösningen blivit grön.
- Injektionspennan skall kasseras senast 48 timmar efter första injektionen.
- Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Denna bipacksedel godkändes senast november 2002