

# Fostimon® Urofollitropin



## Selvadministration

### Injektion



7 Maven omkring navlen og forsiden af låret er egnede til injektion. Følg instruktionerne fra din klinik.



8 Klæm en lille hudfold og stik hele kanylen i en vinkel af 45-90 grader med en hurtig bevægelse. Injicer langsomt hele den ordinerede opløsning og vent 10 sekunder, inden nålen trækkes ud.

Til blanding anvend en ampul til max 6 hætteglas af 75 IU Fostimon®.  
Til blanding anvend en ampul til max 3 hætteglas af 150 IU Fostimon®.

### Noter:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NordicInfu Care AB  
C4 Videncenter, Krakasvej 17  
3400 Hillerød  
Telefon 70 28 10 24  
Fax: 70 28 10 25

[www.infucare.se](http://www.infucare.se)



# Fostimon® – Instruktioner til subkutan injektion

## Forord

Behandlingen, som du nu skal gennemgå, kommer sandsynligvis til at kræve gentagne injektioner. Fostimon® gives langsomt som injektion under huden (subkutan) eller ind i en muskel (intramuskulært). Hvert hætteglas er til engangsbrug. Den korrekte dosis afgøres af lægen. Dosis varierer fra person til person.

Fostimon® må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C. Opbevares i æsken for at beskytte mod sollys. Den tilberedte injektionsopløsning anvendes umiddelbart efter blanding. Fostimon® skal opbevares utilgængeligt for børn. Læs instruktionen grundigt igennem, inden du anvender Fostimon®.

## Tilberedning



- 1 Forbered en ren arbejdsflade og vask hænderne før tilberedning.

**Stil følgende artikler parat på den rene overflade:**

- hætteglas indeholdende Fostimon®
- ampul med væske til opløsning (NaCl 0,9 %)
- ampulåbner
- sprøjte + kanyle



- 2 Fjern plathætten fra hætteglasset, som indeholder Fostimon® pulver.



- 3 Bank let mod toppen af ampulhalsen for at fjerne al væske, der kan sidde i toppen. Hold ampullen, så det farvede mærke er rettet mod dig.



- 4 Hold omkring den riflede del af ampulåbneren og sæt den henover ampulhalsen. Knæk ampullen i retningen væk fra dig selv. Anbring kanylen i ampullen med væske og træk væsken op i sprøjten.



- 5 Tag sprøjten med kanylen og tryk nålen gennem gummimembranen og fyld langsomt væsken ned i hætteglasset med Fostimon® pulver. Lad sprøjten sidde på. Pulveret opløses umiddelbart efter blandingen. Rul hætteglasset let mellem hænderne, indtil pulveret er helt opløst. Hold hætteglasset med gummimembranen nedad og træk opløsningen op i sprøjten. Træk herefter kanyle ud af hætteglasset.



- 6 Skift kanylen til den fine, grå injektionskanyle, som er vedlagt. Hold sprøjten med åbningen opad. Fjern eventuelt store luftbobler ved at banke forsigtigt på sprøjten, så de stiger opad. Pres langsomt på stemplet, til luften er væk. Opløsningen er nu klar til brug.



**VEND VENLIGST** →