


Utprovning av APO-go Pen®

vid Parkinsons sjukdom



Patientens namn:

Datum:

Slutdos:

1. Förbehandling mot illamående: Tablett Motilium 10 mg, 2 x 3, i 3 dagar före besöket.
2. Förmiddagsdoserna av parkinsonmedicinen reduceras enligt ordination av ansvarig läkare. Målet är att framkalla behandlingsbara symtom.
3. Patienten får vila i 10 minuter. Därefter kontrolleras blodtryck samt puls liggande och stående efter 1 minut.
4. Specifika symtom på underdosering kontrolleras och test av Parkinsonism genomförs.

5. Test av Parkinsonism

- Patienten sittande med händerna på låren, notera vilotremor (vänster/höger).
- Be patienten sträcka fram händerna. Notera om vilotremor dämpas och förekomst av ev finvågig postural tremor.
- DDK: Be patienten vända upp handflatorna snabbt (supination) och sedan vända dem tillbaka igen (pronerat läge). Repetera denna rörelse så snabbt som möjligt i ca 10 sek. Notera ev svikt av rotationen.
- Be patienten stampa med en fot i taget, hälen ska lyftas 5–10 cm, så snabbt som möjligt.
- Be patienten resa sig upp; notera balansförmåga.
- Be patienten gå en kort sträcka framåt, vända och komma tillbaka och sätta sig. Notera balans, hållning, gång och medrörelser i armarna.

Test av medicinering med Apo-go Pen

6. Patienten får 1 mg Apomorfin s.c.
7. Nytt blodtryck och puls tas efter 15 min + status enligt punkt 5.
8. Om ingen eller osäker effekt: Ge ytterligare 1 mg Apomorfin s.c. 30 min efter första injektionen.
9. Punkterna 7–8 upprepas ytterligare 1 gång.

Test av patient – utvärdering

10. Effekten av Apomorfininjektionen utvärderas i samråd med ansvarig läkare. Apo-go Pen förskrivs om injektion bedöms kunna hindra de symtom som patienten besväras av dagligen.
11. Patienten och ev anhörig får utbildning i injektionsteknik.
12. Telefonuppföljning efter 1 vecka.